

# Badanie części wolnej kończyny górnej

- 1) Badanie czucia głębokiego w obrębie kg (bierne ustawienie kg przy zamkniętych oczach, test lustra)
- 2) Test dla m. nadgrzebieniowego (przy próbie odwodzenia pacjent nie potrafi odwieść 0-30o- przyparcie głowy k. ramiennej do panewki)
- 3) Objaw Laseque'a górny (odwiedzenie do 90 o i rot. Wew.)

## **Ręka i staw łokciowy:**

- 1) odruchy z m dwugłowego ramienia (C5-6)
- 2) odruchy z m ramiennie-promieniowego(j.w)
- 3) odruch z m trójgłowego (C6-7)
- 4) Test Finkelsteina (choroba De Quervaina- odwodziciel dł. I prostownik krótki kciuka)
- 5) Test Tinella (przeczulica n. łokciowego)
- 6) Objaw Phalena (2 wersja –zgięciowa i wyprostna, czas 1 min)
- 7) Objaw Fromenta (n łokciowy- przywodziciel kciuka, przy dysf. kompensacja za pomocą zgięcia kciuka w st. Międzypaliczkowym)
- 8) Test Allena (tętno promieniowa i łokciowa, czas – do zblednięcia)
- 9) Badanie czucia w obrębie ręki( II punktowe-epikrytyczne)