

Diagnostyka według Vojty - Reakcja zawieszenia pionowego wg Collis

Opracowana w 1954r. przez Collis i zmodyfikowana przez Vojtę.

Lekarze, fizjoterapeuci używają tej próby/testu od wielu lat w celu diagnozowania.

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem

Wprowadzanie: chwytamy dziecko za jedną kończynę dolną w okolicy stawu kolanowego (małe niemowlęta chwytamy bliżej stawu biodrowego za udo, chwyt proksymalny) i nagłym ruchem sprowadzamy dziecko do pozycji pionowej z głową w dół.

Chwyt: chwytamy prawą dłoń za prawe udo

Odpowiedź: zależna od etapu rozwoju dziecka.

1 Faza od 1 tygodnia do końca 6/7 miesiąca

- wolna kończyna dolna przyjmuje pozycję zgięcia w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym.

2 Faza od 7 miesiąca

- wolna kończyna dolna prostuje się w stawie kolanowym natomiast staw biodrowy pozostaje w zgięciu.

Komentarz:

Nieprawidłowa reakcja – wyprost wolnej kończyny dolnej może pojawić się nawet w okresie noworodkowym, gdzie uprzednio wystąpiły zaburzenia.

W okresie noworodkowym wolna kończyna dolna może szybko wyprostować się i jednocześnie szybko zgiąć. Uważa się to za normę..

Podczas badania powinno unikać się gwałtownego podnoszenia.

Manewr powinien być przeprowadzony szybko ale delikatnie aby nie niepokoić niemowlęcia.

Opracowanie:

http://www.vojta.com/cgi-local/ivg_eng.cgi

Tłumaczenie: E.Nowak