

- najczęściej stosowana: digoksyna
- stosowane w niewydolności krążeniowej pochodzenia sercowego

Działanie:

- kardiotropowo
- chronotropowo (–) i dromotropowo (–) — zmniejszenie częstości akcji serca i przewodzenia przedsionkowo-komorowego
- inotropowo (+) — wzmożenie siły skurczu serca
- tonotropowo, batmotropowo (+)

Inotropowe

- wzmożenie siły skurczu serca

Batmotropowe

- wzmożenie pobudliwości
- mocząpędnie (pośrednio, wskutek poprawy rzutu serca)
- parasympatykomimetycznie — nasilają tonus nerwu błędnego
- hamują aktywność pompy Na-K (dochodzi do wzrostu stężenia wewnątrzkomórkowego Na)

Obserwowano:

- zwiększenie objętości minutowej serca
- zwiększenie powrotu żylnego do serca
- zwolnienie pracy serca
- zmniejszenie przekrwienia w żyłach układu dużego i wrotnego
- zmniejszenie obwodowego skurczu naczyń
- obniżenie ciśnienia żylnego

Działanie niepożądane:

- toksyczność (objawy toksyczne: arytmie, zaburzenia przewodzenia, zmiany widzenia)
- bóle brzucha
- nudności
- wymioty
- biegunka



- bezsenność
- częstoskurcz