


Leczenie pourazowego bólu karku za pomocą mikrokinetyterapii

AUTOR : Daniel Grosjean, Patrice Benini

CZASOPISMO : Medycyna manualna tom VIII nr.3i4/2004

SŁOWA KLUCZOWE : agresja, żywotność tkankowa



STRESZCZENIE :

Odczuwane przez pacjentów bóle karku z powodu urazów bezpośrednich i pośrednich, mające postać także ograniczonej ruchomości skępu szyi są niewątpliwie często spotykaną dolegliwością sprawiającą duży dyskomfort. Pomimo, że objawy zaburzeń wskazują na patologię pochodzenia stawowego, to rehabilitacja tego schorzenia nie przez stawy a poprzez pracę z mięśniami metodą mikrokinetyterapii pozwala na uzyskanie lepszych wyników. Znakomitą sprawą jest znajomość współzależności między poszczególnymi mięśniami, stawami, kręgami a odcinkami skóry wykształconymi w fazie embrionalnej. Ta współzależność pozwala poprzez skórę na szyi lub w górnej części dołu podkolanowego zdiagnozować, które konkretnie mięśnie między kręgiem szyi C1 i C2 jest zablokowany i także poprzez skórę wyczuć zaburzony rytm i odblokować go. Poprawa i ulga jest często natychmiastowa. Metoda ta ma szerokie zastosowanie także w leczeniu braku właściwej koncentracji, bólów głowy z powodu niedokrwienia.

WNIOSKI :

W przypadku urazów, kontrola i naprawa zespołu mięśni daje dużo lepsze wyniki niż swoiste oddziaływanie na stawy, ponieważ system statów służy mięśniom i jest od nich zależny. Ponadto naprawy te są bezbolesne i nie mają skutków ubocznych.