

Leki przeciwgrzybicze

LEKI PRZECIWRZYZBICZE – antybiotyki

Typ	Działanie	Zastosowanie	Działanie niepożądane	Przeciwwskazania
G			-ból głowy	
R	wąski zakres			
Y			-zab. przewodu pokarmowego	
Z	-hamuje syntezę chityny* oraz kw.nukleinowych	• grzybice:		
E			-zaburzenia spermatogenezy	
O	-na dermatofity przeciwzapalne	-skóry głowy i gładkiej		
F			-hepatotoksyczne	
U	osłabia działanie lek.:	-paznokci		
L			-nefrotoksyczne	
W	-p.zakrzepowych			
I			-nadwrażliwość na światło	
N	-antykoniecznych mało TOXIC		-reakcje alergiczne	
A			-hipertermia	
			-ból głowy	
A			-omdlenia	
M			-wymioty	
F	-na drożdżaki			
O			-greszcze	-ciąża
T	-na pleśniowce	• grzybice płuc,		
E		• posocznica,		
B	-dimorficzne grzyby Blastomyces	• p.pokarmowego,	-zmiany ciś.krwi	-uczulenie na lek
R	Coccidioides Histoplasma	• zakażenie opon mózg.-rdzeniowych	-szum w uszach	-ch.watrobę i nerek
Y	-narządowe			
C			-trombocytopenia	
Y	TOXIC			
N			-leukopenia	
A			-hepatotoksyczne	
			-nefrotoksyczne	
			-neurotoksyczne	
N				
Y				
S	Podobne do amfoterycyny B	• grzybice: jamy ustnej, gardła, p.pokarmowego,	-zaburzenia	
T				
A	-na drożdżaki		żołądkowo jelitowe	j.w
T		• kandydoza : pochwy, warg sromowych, skóry		
Y	-miejscowe		-reakcje alergiczne	
N				
A				
N				
A p				
T i	-na drożdżaki			
A m		• grzybice skóry,	-nudności	Może być
M a	-na dermatofity			
Y f	-na pierwotniaki: Lamblia Rzęsistek	jamy ustnej, p.pokarmowego, pochwy	-wymioty	stosowany u kobiet w ciąży
C u			-biegunka	
Y c	-miejscowe małoTOXIC			
N i				
A n				

LEKI PRZECIWRZYSZCZĄCE – syntetyczne

F L U C Y T O Z Y N A	-hamuje syntezę tymidynową oraz DNA	• grzybicze:	-nudności	
	-na drożdżaki	w zapaleniu wsierdzia nerek	-wymioty	
	-zakażenia kropidlakowe	uk.moczowego opon mózgowych	-biegunka	-ciąża
	-w kryptokokozie	• kadydioza	-reakcje alergiczne	-uczulenie na lek
	-narządowe	• kryptokokoza	(długotwałe stos.)	-karmienie piersią
	(ancotil, ancobone)		-hepatotoksyczne	
			-nefrotoksyczne	
			-mielotoksyczne	
	-hamowanie biosynt.			
	ergosterolu*			
K L O T R I M A Z O L	-zab.syntezy triglicerydów, fosfolipidów			
	-na dermatofity	• grzybicze:		j.w
	-na dimorficzne	skórne, błon śluzowych jamy ustnej i pochwy		
	-na drożdżaki			
	-przeciwrzęsistkowe			
	-miejscowe			
	-na dermatofity			
	-na dimorficzne			
	-na drożdżaki			
	-przeciwbakteryjne	-mieszane:		j.w
E K O N A Z O L	(ziarniaki Gram+)	zakażenia grzybicze i bakteryjne		
	-na promieniowce			
	-miejscowe			
K E T O K O N A Z O L	-na dermatofity		-zab.żołądkowo- jelitowe	
	-na dimorficzne		-bóle głowy	
	-na drożdżaki	-u pacjentów chorych na AIDS z obniżoną odpornością (zapobiegawczo)	-reakcje alergiczne	
	-w kryptokokozie dość TOXIC		-obniżenie poziomu hormonów płciowych we krwi:	j.w
	-narządowe		-impotencja	
	(nizoral, ketozol)		-ginekomastia	
			-oligospermia	

M I K O N A Z O L	-na dermatofity			
	-na dimorficzne		-reakcje alergiczne	
	-na drożdżaki		-nudności	
	-na ziarniaki Gram+ (paciorkowce, gronkowce)	j.w	-wymioty	j.w
	-narządowe		-biegunka	
(daktarin)	-miejscowe			
I T R A K O N A Z O L	-na dermatofity		-bóle głowy	
	-na dimorficzne		-zab przewodu pokarmowego	
	-na pleśniowce terapia pulsowa*	• grzybice: paznokci	-zab.hormonalne	j.w
	-narządowe		-obrzęki	
	-miejscowe		-hipokalemia	
		• grzybice:	-zapalenie wątroby	
		-jamy ustnej		
		-przełyku		
F L U K O N A Z O L	-hamują biosyntezę ergosterolu	-pochwy		
	-nie powodują zab.hormonalnych	-sromu		
	-na drożdżaki	-otrzewnej		j.w
	-w kryptokokozie	-wsierdzia		
		-dróg oddech.		
		• kryptokokozie:		
		-płuc		
		-skóry		
		-opon mózgowo- rdzeniowych		
	-przenika przez płytkę paznokcia			
	(lakier-Loceryl)	• grzybice:		
Amorolfina	-na dermatofity	-paznokci		
	-na pleśniowce			
	-na drożdżaki			
T E R B I N A F I N A	-hamują biosynt.			
	ergosterolu		rzadko	
	-najskuteczniejszy w działaniu :		-bóle brzucha	j.w
	-na dermatofity		-brak łaknienia	
	-na drożdżaki		-wysypki	

