



| Typ                              | Działanie                                                           | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Działania niepożądane                                                                                                                                                                                      | Przeciwwskazania                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acyklowir</b>                 | Hamuje polimerazę wirusowego DNA oraz replikację. Działa na wirusy: | <ul style="list-style-type: none"><li>• opryszczone:<ul style="list-style-type: none"><li>- ust</li><li>- spojówek</li></ul></li><li>-</li></ul>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                  |                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• zewnętrznych narządów płciowych - zapalenie</li><li>• opon mózgowych</li><li>• ospa wietrzna</li><li>• półpasiec</li><li>• mononukleozę zakaźną</li><li>• w terapii HIV/AIDS (w odpowiednich wskazaniach)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• podrażnienie</li><li>• pieczenie</li><li>• nudności</li><li>• wymioty</li><li>• odwracalne zmiany neurologiczne (rzadko)</li><li>• zmiany w obrazie krwi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ciąża</li><li>• uczulenie na lek</li><li>• karmienie piersią</li></ul> |
| <b>Gancyklowir / Famcyklowir</b> | jak wyżej                                                           | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                                                   | jak wyżej                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| <b>Idoksurydyna</b>              | Działa miejscowo na wirusy (m.in. opryszczone, półpasiec).          | Opryszczone zapalenie rogówki i spojówki (miejscowo).                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• podrażnienie</li><li>• ból</li><li>• obrzęk</li><li>• fotofobia</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                |
|                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• przypuszczalnie lek może się wbudowywać do DNA człowieka (dlatego stosowany miejscowo)</li></ul>                                                                   |                                                                                                                |
| <b>Triflurydyna</b>              | Na wirusa opryszczonego typu I i II (miejscowo).                    | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |

|                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ribawiryna</b> | <p>Szeroki zakres działania;<br/>hamuje replikację wirusów DNA i RNA.</p> <p>Działa na wirusy, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• herpes</li><li>• RSV (syncytialny)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• grypa typu A i B</li><li>• wirusowe zapalenie płuc i oskrzelików</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• zaburzenia przewodzenia pokarmowego</li><li>• zaburzenia neurologiczne</li><li>• niedokrwistość hemolityczna</li></ul> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|