

| Typ                              | Działanie                                                                                                                                                                                                            | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Działania niepożądane                                                                                                                                                                                                    | Przeciwwskazania                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acyklowir</b>                 | Hamuje polimerazę wirusowego DNA oraz replikację. Działa na wirusy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opryszczki</li> <li>• varicella zoster (ospę wietrzną / półpasiec)</li> <li>• Epsteina-Barra</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• opryszczka: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ust</li> <li>- spojówek</li> <li>- zewnętrznych narządów płciowych</li> <li>- zapalenie opon mózgowych</li> <li>• ospa wietrzna</li> <li>• półpasiec</li> <li>• mononukleozą zakaźną</li> <li>• w terapii HIV/AIDS (w odpowiednich wskazaniach)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podrażnienie</li> <li>• pieczenie</li> <li>• nudności</li> <li>• wymioty</li> <li>• odwracalne zmiany neurologiczne (rzadko)</li> <li>• zmiany w obrazie krwi</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciąża</li> <li>• uczulenie na lek</li> <li>• karmienie piersią</li> </ul> |
| <b>Gancyklowir / Famcyklowir</b> | jak wyżej                                                                                                                                                                                                            | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Idoksurydyna</b>              | Działa miejscowo na wirusy (m.in. opryszczki, półpasiec).                                                                                                                                                            | Opryszczkowe zapalenie rogówki i spojówki (miejscowo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podrażnienie</li> <li>• ból</li> <li>• obrzęk</li> <li>• fotofobia</li> <li>• przypuszczalnie lek może się wbudowywać do DNA człowieka (dlatego stosowany miejscowo)</li> </ul> |                                                                                                                    |
| <b>Triflurydyna</b>              | Na wirusa opryszczki typu I i II (miejscowo).                                                                                                                                                                        | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |

|                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ribawiryna</b> | <p>Szeroki zakres działania;<br/>hamuje replikację wirusów DNA i RNA.<br/>Działa na wirusy, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• herpes</li><li>• RSV (syncytialny)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• grypa typu A i B</li><li>• wirusowe zapalenie płuc i oskrzelików</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• zaburzenia przewodzenia pokarmowego</li><li>• zaburzenia neurologiczne</li><li>• niedokrwistość hemolityczna</li></ul> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|