

Leki przeciwwirusowe analogi nukleozydowe

	Typ	Działanie	Zastosowanie	Działanie niepożądane	Przeciwwskazania
ACYKLOWIR		-opryszczka:			
	-hamuje polimeraze	• ust	-podrażnienie		
	wirusowego DNA	• spojówek	-pieczenie		
	oraz replikację	• zew.n.płciowych	-nudności	-cięża	
	-działa na	• zap.opom mózgowych	-wymioty	-uczulenie na lek	
	• wirus :		-odwracalne zmiany neurologiczne	-	
	-opryszczki zwykłej	-ospa wietrzna		karmienie piersią	
		-półpasiec			
	-varicellaezoster	-mononukleozą zakaźną	-zmiany w obrazie krwi		
	-Epsteina-Barr				
GANCYKLOWIR FAMCYKLOWIR		-w terapii AIDS			
	j.w	j.w	j.w		
			-podrażnienie		
			-ból		
	• na wirusy :		-obrzęk		
	-opryszczki	-opryszczkowe zapalenie rogówki i spojówki	-fotofobia		
	-półpaśca		-przypuszczalnie lek wbudowuje się		
	-miejscowo		do DNA człowieka		
TRIFLURIDYNA	na wirusa opryszczki	j.w			
	typu I i II. miejscowo				
	-szeroki zakres		-zab.przewodu pokarmowego		
	-hamuje replikację wirusów DNA,RNA	-grypa typu A i B	-		
	• wirusy:	-wirusowe zap.płuc i oskrzelików	zab.neurologiczne		
	-herpes		-niedokrwistość		
	-RSV		hemolityczna		