

Leki stosowane w nadciśnieniu

- 1) Leki moczopędne
- 2) Leki B-adrenolityczne :
 - (metoprolol, atenolol, bisoprolol – kardioselektywne B1)
 - (propranolol, pindolol, nadolol – nieselektywne B1 & B2)
- 3) Inhibitory konwertazy angiotensyny I i antagoniści receptora angiotensynowego AT1
- 4) Leki blokujące kanały wapniowe
- 5) Leki o ośrodkowym działaniu hipotensyjnym :
 - 1.pobudzające rec.L2 –adrenergiczny np. KLONIDYNA
 - 1.pobudzające rec.I1 np. RILMENIDYNA, MOKSONIDYNA
 - METYLODOPA – działa ośrodkowo , hamuje wytwarzanie NA, działa agonistycznie na receptor L2-adrenergiczny
 - REZERPINA – alkaloid rośliny, zaburza magazynowanie neuroprzekaźników
- 6) Leki o działaniu obwodowym sympatykolitycznym – pochodne guanidyny
- 7) Leki hipotensyjne blokujące zwoje uk.współczulnego – HEKSAMETONIUM
- 8) Leki adrenolityczne blokujące rec.L1 – PRAZOSYNA,doksazosyna,terazosyna
- 9) Leki rozkurczające m.gładkie naczyń
- 10) Leki pobudzające kanały potasowe