

Leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV

Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
			-uszkodzenie szpiku	
	-hamuje wir.HIV-1		-anemia	
	słabiej HIV-2		-ból głowy	
Zidowudyna	-działa na HTLV-1	-leczenie AIDS	-parestezje	
	-inhibitor odwrotnej transkryptazy		-nudności	
	TOXIC		-wymioty	
			-hiperpigmentację	
Stawudyna	j.w	-stosowana w 2	j.w	
	bardziej TOXIC	kolejności		
Didanozyna	-działa na HIV-1 i 2	-leczenie AIDS	-pokarm upośledza	
	oporne na zidowudyne		jej wchłanianie	
Zalcytabina	j.w	j.w	-neutropenia,	
			zap.trzustki,nerwów	

LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIU W.HIV – inhibitory proteazy HIV

			-interakcje	
Ritonawir	-działają	-leczenie AIDS	-uczucie drętwienia	
	bezpośrednio na proteazę		-osłabienie	
			-zab.żołądkowo- jelowe	
			-nasilenie	
Indinawir	j.w	j.w	krwawień (w hemofili)	
	mniej		-kamienica nerkowa	
			-ból głowy,mięśni	
			-zab.ż-j	
			-łagodne	
Sankwinawir	j.w	j.w	-zab.ż-j	
			-zap.trzustki	
			-depresja	