

Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
Zidowudyna	• hamuje wir. HIV-1 (słabiej HIV-2) • działa na HTLV-1 • inhibitor odwrotnej transkryptazy • toksyczny	• leczenie AIDS	• uszkodzenie szpiku – anemia • bóle głowy • parestezje (neuropatia obwodowa) – może wpływać na możliwości rehabilitacji • nudności, wymioty • hiperpigmentacja	-
Stawudyna	• jak wyżej (j.w.) • bardziej toksyczna	• stosowana w drugiej kolejności	• jak wyżej	-
Didanozyna	• działa na HIV-1 i HIV-2 • stosowana przy oporności na zidowudynę	• leczenie AIDS	• pokarm upośledza wchłanianie	-
Zalcytabina	• jak wyżej (j.w.)	• jak wyżej	• neutropenia • zapalenie trzustki • zapalenie nerwów obwodowych (może ograniczać funkcję motoryczną)	-

LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIU W.HIV - inhibitory proteazy HIV

Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
Ritonawir	• działają bezpośrednio na proteazę	• leczenie AIDS	• liczne interakcje lekowe (ważne przy farmakoterapii towarzyszącej) • uczucie drętwienia • osłabienie • zaburzenia żołądkowo-jelitowe	-



Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
Indinawir	• jak wyżej (mniej nasilone)	• leczenie AIDS	• nasilenie krwawień u chorych z hemofilią • kamica nerkowa • bóle głowy, bóle mięśni • zaburzenia żołądkowo-jelitowe • łagodne zaburzenia • zaburzenia	-
Sakwinawir	• jak wyżej	• leczenie AIDS	• żołądkowo-jelitowe • zapalenie trzustki • depresja	-