

Monitorowanie efektów terapii u dziecka z zespołem Gulliana-Barre

AUTOR : Anna Brandowska, Andrzej Gawrysiak

CZASOPISMO : Medycyna Manualna tom X nr 2 i 3/2006



SŁOWA KLUCZOWE : Zespół Gulliana-Barre, test Denver, monitorowanie rozwoju, elektrostymulacja

STRESZCZENIE :

Praca zawiera ocenę rozwoju 11-miesięcznej dziewczynki, u której stwierdzono zespół Gulliana-Barre. Opisano jego etiologię, powikłania oraz wpływ na psychomotorykę dziecka. Przedstawiono wykorzystywane formy terapii w procesie usprawniania. Obserwacja usprawniania trwała 10 miesięcy i monitorowana była za pomocą testu Denver.

WNIOSKI :

- 1) Bodźcowanie polisensoryczne ma pozytywny wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka, przyczyniając się do pozytywnych, progresywnych skosków rozwojowych.
- 2) Fizjoterapia dziecka ZGB powinna zawierać różnorodne formy terapii uwzględniając również defekty neurologiczne jak i zaburzenia psychoruchowe.
- 3) Systematyczność i ciągłość terapii stwarza szansę na powrót do prawidłowego rozwoju psychoruchowego.
- 4) Test Denver jest przydatnym narzędziem monitorowania rozwoju dziecka i umożliwia celowe modyfikowanie dróg terapii.

TEST PSYCHORUCHOWEGO ROZWOJU DZIECKA DO LAT 6 - ORIENTACYJNY TEST DENVER

