

Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
Paracetamol (APAP)	• przeciwbólowe • przeciwgorączkowe • podawany dzieciom • nie wykazuje istotnego działania przeciwzapalnego (nie jest NLPZ)	• ból: - głowy - • miesięczkowy - zębów - pleców - barku - mięśni • gorączka	• nudności • wymioty • hepatotoksyczność przy przedawkowaniu • zmiany w obrazie krwi (rzadko) • wzmacnia działanie leków przeciwzakrzepowych • alergię: wysypka, pokrzywka	• ciąża (ostrożnie, stosować tylko gdy korzyść przewyższa ryzyko) • uczulenie na lek
Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)	• przeciwbólowe • przeciwgorączkowe • przeciwzapalne, przeciwreumatyczne • antyagregacyjne (profilaktyka zawałów przy niskich dawkach; wpływ na agregację płytek)	• ból: - głowy - zębów - stawowe - mięśniowe - stawowo-kostne • gorączka • RZS • choroby narządu ruchu: - ZZSK - RZS - obrzęki - bóle • pourazowe • - • zwyrodnienia • kolka nerkowa • zapalenie nerwów, nerwobóle • dna moczanowa	• zawroty głowy • bóle głowy • krwawienia z żołądka • niedokrwistość w wyniku utajonych krwawień • smoliste stolce (oznaka krwawienia)	• ciąża • uczulenie na lek • choroby wirusowe (ryzyko zespołu Reye'a u dzieci) • katar sienny • polipy nosa z nadwrażliwością na NLPZ
Diklofenak (Voltaren, Majamil, Feloran)	• przeciwbólowe • przeciwgorączkowe • przeciwzapalne, przeciwreumatyczne	• choroby narządu ruchu: - ZZSK - RZS - obrzęki - bóle • pourazowe • - • zwyrodnienia • kolka nerkowa • zapalenie nerwów, nerwobóle • dna moczanowa	• rzadko - zaburzenia układu krwiotwórczego	• ciąża • uczulenie na lek • niewydolność mięśnia sercowego

Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
Ibuprofen (Ibuprom)	• przeciwbólowo • przeciwgorączkowo • przeciwzapalnie, przeciwreumatycznie • stosunkowo najmniej toksyczny spośród niektórych NLPZ	• choroby narządu ruchu: - ZZSK - RZS - bóle pourazowe - • zwyrodnienia - obrzęki • zapalenie nerwów, nerwobóle • kolka nerkowa • dna moczanowa • bóle: - - pooperacyjne - po ekstrakcji - trzewne • choroby narządu ruchu: - ZZSK - RZS - bóle pourazowe - • zwyrodnienia - rwa kulszowa - zapalenie kaletki, ścięgna i korzonków - dna moczanowa	• zaburzenia gastryczne • zaburzenia ośrodkowe • zgaga • senność • szum w uszach	• ciąża • uczulenie na lek • niewydolność mięśnia sercowego • nadciśnienie (ostrożność)
			• rzadko, łagodne: alergie, zawroty głowy, senność	
Piroksykam (Piroxicam)	• przeciwbólowe • przeciwgorączkowe • przeciwzapalne, przeciwreumatyczne	• choroby narządu ruchu: - ZZSK - RZS - bóle pourazowe - • zwyrodnienia - rwa kulszowa - zapalenie kaletki, ścięgna i korzonków - dna moczanowa	• rzadko, łagodne: alergie, zawroty głowy, senność	• ciąża • uczulenie na lek • osoby starsze (większe ryzyko działań niepożądanych)



Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
Indometacyna (Indometacin, Metindol)	• silne przeciwzapalne • przeciwgorączkowe, przeciwbólowe • toksyczny przy długim stosowaniu	• bóle: - głowy - • miesiączkowe - • reumatyczne - nerwobóle • choroby narządu ruchu: - ZZSK - RZS - • zwyrodnienia - zapalenie kaletek - rwa kulszowa	• duże i silne działania niepożądane: bóle głowy, zawroty • wzrost tendencji samobójczej, depresja (opisane w literaturze) • hepatotoksyczne, nefrotoksyczne	• praca przy maszynach (zaburzenia koncentracji) • choroby psychiczne
Pyralgina (Metamizol, Noramidopyryna)	• silne przeciwbólowe	• różne rodzaje bólu	• zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: bóle głowy, zawroty • zaburzenia funkcji układu krwiotwórczego (agranulocytoza, ryzyko ciężkie) • wstrząs przy podaniu dożylnym (rzadko)	• ciąża • uczulenie na lek • choroby wątroby • choroby nerek
Fenylbutazon (Butapirazol)	• przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie • dość toksyczny • zwiększa wydalanie kwasu moczowego • dawniej preferowany w leczeniu dny (niższe stosowanie obecnie z uwagi na toksyczność)	• choroby o podłożu reumatycznym • rwa kulszowa, staw barkowy • zakrzepowe zapalenie żył • ataki dny moczanowej (historycznie stosowany)	• bóle głowy, zawroty • nudności, biegunka, zgaga • zaburzenia ośrodkowe	• choroby wątroby • choroby nerek • choroby szpiku • choroba wrzodowa dwunastnicy



Typ	Działanie	Zastosowanie	Niepożądane działanie	Przeciwwskazania
Meloksykam	• przeciwbólowe • przeciwgorączkowe, przeciwzapalne • hamuje COX-2 w większym stopniu niż COX-1 (preferencyjny inhibitor COX-2)	• RZS • choroba zwyrodnieniowa	• działania ze strony układu pokarmowego • odczyny skórne	• stosowanie leków hipotensyjnych (może osłabiać efekt) • choroba wrzodowa • niewydolność nerek
Celekoksylb (Celebrex)	• przeciwbólowe • przeciwgorączkowe, przeciwzapalne • selektywny inhibitor COX-2 • nie hamuje agregacji płytek	• jak wyżej (choroby zapalne i bólowe narządu ruchu; wskazania zgodnie z rejestracją)	• uczulenie u osób uczulonych na sulfonamidy (może wystąpić)	• ciąża • uczulenie • choroby wątroby • wskazania uwzględnione w charakterystyce produktu leczniczego