Pozycje ułożeniowe

1. We wstrząsie, zapaści naczyniowej (pozycja z uniesieniem kończyn dolnych, około 30°)
2. Przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym, przepuklinie przeponowej (głowa uniesiona około 30°)
3. Zakażenia, zapalenia kończyn dolnych (zakrzepowe zapalenie żył) (uniesienie kończyny powyżej poziomu serca w celu zmniejszenia obrzęku)
4. Po operacjach na narządach miednicy (pozycje ułatwiające odpoczynek i zmniejszające napięcie mięśniowe)
5. Nieprzytomni, wymiotujący (pozycja boczna ustalona — pozycja bezpieczna)

Bibliografia

- *Fizjoterapia pediatryczna* — J. Tecklin
- *Podstawy rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu* — K. Milanowska
- *Rehabilitacja w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych; rehabilitacja w astmie* — Włodzimierz Dolecki, Witold Rongies (Esculap, artykuł)
- *Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego* — S. Grochmala
- *Lecznicze ćwiczenia oddechowe w chorobach płuc* — A. Rosławski