

Psychogenne uwarunkowania zaburzeń czynnościowych kręgosłupa szyjnego

AUTOR : Aneta Hak, Grażyna Czerwiak, Marek Zięba, Jadwiga Krawczyńska, Ewelina Kamińska, Sebastian Zapart, Mirosław Janiszewski, Rafał Studnicki, Łukasz Łuczkowski

CZASOPISMO : Medycyna manualna tom IX nr.1i2/2005

SŁOWA KLUCZOWE : przewlekły ból szyi, zaburzenia psychogenne



STRESZCZENIE :

Przyczyn bólu szyi jest wiele. Okazuje się, że w sensie psychospołecznym ból może przejść w fazę podostłą i dalej chroniczną. Określono to tensencją do somatyzowania problemów emocjonalnych, do których rozwiązania brakuje umiejętności. Wysłunięto wniosek, że to, kto będzie chorował w sposób

przewlekły zależy zarówno od kombinacji czynników fizycznych jak i psychospołecznych.

WNIOSKI :

Dotychczasowy model biomedyczny rozumienia choroby zgodnie z aktualną wiedzą nie wystarcza, aby skutecznie i w pełni wykorzystać wszystkie zdobycze nauk przyrodniczych i humanistycznych w pomoc chorem.