

Skala Rutherforda

Stosowana w medycynie do oceny stopnia niedokrwienia.

Podstawą planowania postępowania diagnostycznego i leczniczego jest klasyfikacja Rutherforda, wyróżniająca 3 kategorie zagrożenia kończyny.

1. Kategoria - żywotna (brak bezpośredniego zagrożenia)
2. Kategoria - zagrożona

- marginalnie
- krytycznie

3. Kategoria - nieodwracalna

Inny podział:

0 – nie ma objawów klinicznych

I –

- 1 – chromanie łagodne
- 2 – chromanie umiarkowane
- 3 – chromanie ciężkie;

II – spoczynkowy ból niedokrwienności

III – niewielkie ubytki tkanki

IV – owrzodzenia lub martwica

Bibliografia :

Fontaine R, Kim M, Kieny R (1954). Die chirurgische Behandlung der peripheren Durchblutungsstörungen. (Surgical treatment of peripheral circulation disorders). Helvetica Chirurgica Acta (in German) 21(5/6): 499–533

Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW, et al. Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg. 1997 Sep; 26(3):517-38

M. Gabriel - Ocena kliniczna i diagnostyka ostrego niedokrwienia