

Wodogłowie

(Hydrocephalus)



Jest to nieprawidłowość budowy ośrodkowego uk.nerwowego. Charakteryzuje się gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego w jamie czaszki. Często występuje w połączeniu z przepukliną oponowo-rdzeniową

Przyczyny :

- stan zapalny opon
- krwawienia śródczaszkowe
- wady rozwojowe
- guzy

Może wynikać z :

- nadmiernego wytwarzania płynu
- upośledzenia wchłaniania zwrotnego
- przeszkody w prawidłowym odpływie

Objawy :

- „zachodzącego słońca” – obniżenie się oczu w oczodołach
- wzrost obwodu głowy
- zaburzenia ruchowe
- objawy piramidowe
- niezdolność mózdkowa

Rodzaje :

- Wodogłowie zewnętrzne – dotyczy przestrzeni podpajęczynówkowej
- Wodogłowie wewnętrzne – dotyczy komór
- Wodogłowie wrodzone
- Wodogłowie nabyte


Leczenie :

1/3 przypadków dochodzi do samoistnego zatrzymania wodogłowia. Reszta leczenie chirurgiczne poprzez wszczępienie przetoki

Figure 5

Child after Shunt Surgery

The shunt, a thin straw-like device, is placed in the enlarged ventricles tunneled under the skin and placed in the abdominal cavity. This provides a pathway for the flow of spinal fluid, preventing the buildup of this fluid and controlling hydrocephalus.



Nowotny – Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu Tecklin – Fizjoterapia pediatryczna
<http://www.spinabifidamoms.com/english/about.html>