

1. Objaw szczytowy
2. Test de Kleina i Nieuwenhuysena
3. Test różnicujący dla zawrotów głowy (pozycja siedząca). Należy wykonać na przemian z otwartymi i zamkniętymi oczami kilkanaście szybkich ruchów w różnych kierunkach, następnie objąć chwytem głowę i tułów. Interpretacja: jeżeli w pierwszej próbie wystąpią zawroty przy otwartych, a przy zamkniętych oczach nie — komponenta oczna; powtarzane ruchy przy ustabilizowanym kręgosłupie — komponent błędnikowy; przy ruchach całego tułowia z zamkniętymi oczami — komponent szyjny. (Test pomaga różnicować przyczyny przedsionkowe, okulomotoryczne i szyjne.)
4. Próba chodu gwiazdowego Babińskiego-Weila — dwa kroki do przodu, dwa do tyłu z zamkniętymi oczami. W zaburzeniach błędnikowych i mózdkowych zbacza w kierunku uszkodzenia.
5. Próba kroków Unterbergera — 50 kroków w miejscu, z zamkniętymi oczami, z wysokim unoszeniem kolan. Wyrażna zmiana toru powyżej 45° — komponent błędnikowy (test ocenia funkcję przedsionkową).
6. Próba pokazywania Barany'ego (oczy zamknięte, palce wycelowane na wprost; następnie podnieść ręce w górę i powrócić w to samo miejsce) — próba błędnikowa.
7. Test Romberga (ręce w przód): 1 minuta z otwartymi oczami, 1 minuta z zamkniętymi oczami. Interpretacja — dodatni test może wskazywać dysfunkcję mózdku lub błędnika; przy dodatniej próbie z zamkniętymi oczami i ujemnej z otwartymi — uszkodzenie sznurów tylnych (ocenia propriocepcję i funkcję błędnika).
8. Próba Hautanta
9. Test przywiedzenia horyzontalnego ramion (pozycja siedząca, pacjent trzyma ręce stroną grzbietową na biodrach; czynne przywiedzenie z końcowym dopchaniem łokci). Interpretacja — test pozytywny sugeruje pierwotnie barkową dysfunkcję, wynik negatywny sugeruje ból z przeniesienia z odległych struktur.
10. Test rozety (jak przy badaniu Bischofa)
11. Test antefleksji (ukłon japoński) — brak ruchu na 3 segmentach = test pozytywny; może świadczyć o skłonnościach preskoliozycznych; u dorosłych może wskazywać zablokowanie w wyproście.
12. Test prowokacyjny wyprostny (wyprost za pomocą wyciągniętych rąk, głowy, nóg). Bada się V stawy kręgosłupa. Ból świadczy o zablokowaniu w zgięciu.
13. Test prowokacyjny rotacyjny (pozycja leżąca na brzuchu). Badający wykonuje rotację kręgosłupa za pomocą ręki zgiętej 90° w łokciu, badając jednocześnie ruchomość V kręgosłupa. Ból świadczy o dysfunkcji rotacyjnej.
14. Test Lewady (unoszenie bierne tułowia za pomocą chwytu pod ramiona). Badamy V kręgosłup. Ból świadczy o przeciążeniu stawów kręgosłupa.
15. Objaw wyprzedzania dla segmentów ruchowych kręgosłupa
16. Test Bragarda

17. Test Lasegue'a
 18. Skrzyżowany objaw Lasegue'a
 19. Objaw Pidellu
 20. Objaw Derbolowskiego
 21. Objaw cofania Giotta (unoszenie kgt w trakcie przyciągnięcia kd świadczy o zablokowaniu skb)
 22. Objaw Lee-Walsh'a (pozycja stojąca, wyprost kończyny dolnej do momentu ustawienia grzbietowego stopy; brak uniesienia kbt lub jego opadanie — zaburzenie czynnościowe ruchu przedniej rotacji)
 23. Objaw Flamenco (stanie na jednej kończynie dolnej lub wykonywanie podskoków — ból świadczy o przeciążeniu miednicy, stawów krzyżowo-biodrowych lub spojenia łonowego)
 24. Test Gaenslena
 25. Test Thompsona (pozycja leżąca na brzuchu, stabilizacja miednicy; podniesienie wyprostowanej kończyny dolnej do góry, następnie powtórzyć z drugą kończyną. Różnica zakresów ruchu może sugerować skręcenie miednicy)
 26. Test Yeomana (bierne uniesienie kończyny dolnej zgiętej w stawie kolanowym ze stabilizacją stawu krzyżowo-biodrowego). Ból w okolicy krzyżowej — przeciążenie więzadeł przednich KB; ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym — dysfunkcja kręgosłupa.
 27. Test Goldthwaita (pozycja leżąca na plecach, podłożenie ręki pod odcinek lędźwiowo-krzyżowy, zginanie nóg do klatki piersiowej). Ból przed wystąpieniem separacji wyrostków kolczystych — dysfunkcja stawów krzyżowo-biodrowych.
 28. Test kompresyjny
 29. Test dystrakcyjny
 30. 30) Testy napięciowe dla więzadeł miednicy:
 - Ligamentum iliolumbale
 - Ligamenta sacroiliaca et ligamentum sacrospinale
 - Ligamentum sacrotuberale
- Tekst uzupełniający — testy napięciowe:
- LLTT 1
 - LLTT 2
 - LLTT 3